

Odrobaczanie

Lek. wet. Kinga Matczyk

Przez odrobaczanie rozumiemy profilaktykę przed inwazją pasożytów takich jak glisty *Toxocara canis*, *Toxoascaris leonina*, tasiemce *Echinococcus spp.*, *Taenia spp.*, *Dipylidium caninum* a także włosogłówki i tęgoryjce. Wszystkie te stworzenia są przedstawicielami powszechnie znanych gromad jakimi są płazińce i obleńce.



Standardowo zwierzę odrobaczamy co pół roku, chyba, że w domu jest małe dziecko- wtedy mamy prawo to robić nawet co kwartał. W przypadku szczeniąt, staramy się zawsze odrobaczyć je 3-krotnie, mniej więcej w odstępach miesięcznych, zanim osiągną pół roku życia, rozpoczynając cykl odrobaczeń mniej więcej w wieku 6-ciu tygodni. Również zanim zaszczepimy zwierzę, powinniśmy mniej więcej na 2 tygodnie przed tym, odrobaczyć je.

Specyfika leków przeciwko pasożytom wewnętrznym polega na dwóch bardzo ważnych faktach. Po pierwsze-odrobaczenie działa tylko „tu i teraz”, nie działa „do przodu” więc już w kilka dni po odrobaczeniu zwierzę- jeśli będzie miało kontakt z pasożytem, prawdopodobnie znowu stanie się jego ofiarą.

Po drugie, WIĘKSZOŚĆ leków odrobaczających działa tylko na postaci dorosłe pasożytów a więc „omija” jaja i larwy. W związku z tym jeśli stwierdzimy, że nasze zwierzę ma pasożyty wewnętrzne, odrobaczamy je zazwyczaj w systemie „dwukrotnie w ciągu 10 dni” lub codziennie przez 3 dni, w zależności od rodzaju tabletki(zawartość, producent), który podajemy.

